



蔬菜蚜蟲


Vegetable Aphids



圖 1：蚜蟲體長約 2 – 5mm



圖 2：蚜蟲群集於菜心莖上為害

寄主作物	<ul style="list-style-type: none">● 主要作物：菜心、生菜、蘿蔔、豆角、青瓜、茄子等。
為害時期	<ul style="list-style-type: none">● 全年均可進行為害。
生活史	<ul style="list-style-type: none">● 卵 → 若蟲 → 成蟲；● 本港主要有 5 款蚜蟲，包括桃蚜、菜蚜、偽菜蚜、棉蚜及生菜白尾紅蚜；● 成蟲及若蟲群集於作物的心芽、葉柄及葉背。
為害狀	<ul style="list-style-type: none">● 成蟲及若蟲均會吸取作物的營養，導致葉片捲縮或萎凋，甚至枯死；● 另外，牠們會分泌蜜露誘發煤煙病，阻礙作物進行光合作用，影響作物生長；● 桃蚜及其它蚜蟲會作為植物病毒病傳播的媒介。
農業防治	控制蟲源： <ul style="list-style-type: none">● 注意田間衛生，清理田間雜草，減少蟲源；● 實行輪作，減低蚜蟲世代繁殖的機會。
物理防治	黃色誘殺板： <ul style="list-style-type: none">● 具有趨黃習性，利用黃色誘殺板可誘殺蚜蟲。
生物防治	天敵： <ul style="list-style-type: none">● 草蛉 <i>Chrysopa</i> sp. 
藥劑防治	<ul style="list-style-type: none">● 環保農藥：天然除蟲菊素 (2P168)、礦物油 (2P193)、苦楝油 (2P262)● 常規農藥：毒死蜱 (2P48)、氯氰菊酯 (2P62)、馬拉硫磷 (2P125)