

有機小甜瓜

栽培技術



甜瓜喜溫暖，忌濕及容易受病蟲害侵襲。本地夏季多雨，應利用溫室或防雨、防蟲棚來栽種甜瓜。



甜瓜的品種很多，有厚皮與薄皮的，
也有網紋與光滑的。



網紋甜瓜



光滑甜瓜

推介品種



金蜜



銀輝

金蜜

微扁圓形、果皮金黃色

皮薄肉厚、清甜 (10.6 % Brix)

果重約一公斤



銀輝

微扁圓形、果皮白綠色


皮薄肉脆、甜度高 (16.5 % Brix)

果重約四百克



種植小甜瓜

適播期：三月至十月（以育苗移植為佳）




- 由播種至採收約需七十至七十五天，一年可以有三至四造收成

	溫室 (使用種植盆)	防雨棚 (使用泥哇)
每株種植面積	2.6 平方呎	6平方呎
株行距	-	2呎 x 4呎

一所2000平方呎的溫室可栽種約315株
一斗種地 (7260 平方呎)可栽種約900株

小甜瓜的生長及栽種工作表

植株生長曆



栽種工作曆

調配栽培土



泥：沙：堆肥 = 1：1：2

施肥

- 基肥為主，追肥為輔

- 於生長期間，
每星期追一次液肥
(淋麩水或施噴魚肥)



- 於苗期、開花及結果期，
追加有機肥

灌溉



適當水分



節制水分




較多水分



節制水分


幼苗生長期




開花坐果期



果實膨大期



果實成熟期



栽培管理

直接播種





育苗移植



採用掛繩方式支撐藤蔓生長




- **摘心** 將生長點(頂芽)摘去，以促進側蔓生長及令植株的營養分配得以調節，利於果實發育。



母蔓擁有 3 或 4 片真葉時需要摘心

孫蔓留果之植株調整

- 非留果孫蔓可放任生長或留一葉摘心
- 子蔓長 20 多片葉子時便可摘心
- 留果蔓長 2 至 3 片葉子便可摘心
- 每一留果蔓留果 1 個，每一植株留果 4 個
- 子蔓第 9 節以上的孫蔓，可選 2 條壯蔓作留果蔓
- 子蔓第 8 節以下的孫蔓可全部摘除
- 選留 2 條壯健子蔓
- 母蔓長 3 至 4 葉時摘心



雄花



雌花



人工授粉

果實發育 (金蜜)



果實發育(銀輝)



果熟待收



金蜜

銀輝



謝謝

