

沙羅洞

1. 概覽

1.1. 位置及範圍

本地點位於新界東北部，被八仙嶺郊野公園環抱，南面約 3.8 公里為大埔新市鎮市中心。

1.2. 地點簡介

本地點內有村屋、風水林、林地、農地、草地、灌木林、沼澤及淡水溪流，位處非直接集水區上部，當中的荒廢農地有多條緩流山溪，匯流至北面的鶴藪水塘。由於 1960 年代沙羅洞谷曾進行再造工程闢建農地，因此現時地勢頗為平坦(160 米)。山谷附近脊嶺和巒峰起伏，西臨高 440 米的九龍坑山，北倚高逾 600 米的屏風山脈，南面是一座 300 多米高的無名山嶺。

1.2.1. 土地類別/年期

- 政府土地 = 29.1 公頃
- 私人土地 = 25.5 公頃

1.2.2. 現時土地用途

- 荒廢農地，另有數幢村屋。

1.2.3. 現行法定規劃圖的覆蓋範圍

沙羅洞大部分範圍均已在分區計劃大綱圖(S/NE-SLT/4)列為「自然保育區」及「綠化地帶」。多條溪流及溪兩旁的 30 米緩衝區已列為「具特殊科學價值地點」，現有村屋及擴展區則列為「鄉村式發展」。

2. 評估

評估準則 (比重)	評語	評分	加權 分數
1. 天然程度 (15%)	● 主要生境為淡水沼澤、自然溪流及荒廢農地，因此列為半自然環境。	2	0.30
2. 生境多樣性 (15%)	● 本地點共有三大類生境：自然溪流及季候性沼澤、荒廢乾農地及風水林。	2	0.30
3. 重新建立的 難度 (10%)	● 沙羅洞擁有不同的生態環境，如溪流、淡水沼澤和風水林，因此極難再造。	3	0.30
4. 物種多樣性 及豐富程度 (30%)	● 錄得高度多樣性(高於50%)的生物分類群有兩棲類動物(14種，61%)及蜻蜓(72種，65%)，中度多樣性(高於20%但不超過50%)的有蝴蝶(95種，40%)	3	0.90
5. 物種稀有程 度/獨特性 (30%)	<ul style="list-style-type: none"> ● 本地點有一種香港特有的蜻蜓－伊中偽蜻 (<i>Macromidia ellanae</i>)，以及一種香港特有的淡水魚－香港鬥魚 (<i>Macropodus hongkongensis</i>)。 ● 本地點有六個生物分類群的稀有物種居群： <ul style="list-style-type: none"> ■ 蝶花莢迷 (<i>Viburnum hanceanum</i>)及鏡子薹草 (<i>Carex phacota</i>)。 ■ 哺乳類動物：穿山甲 (<i>Manis pentadactyla</i>)。 	3	0.90

評估準則 (比重)	評語	評分	加權 分數
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 鳥類¹：白腹山鷗、鳳頭鷹、小鴉鵂*、褐翅鴉鵂*及綠翅金鳩。 ■ 爬蟲類：三線閉殼龜 (<i>Cuora trifasciata</i>)。 ■ 蝴蝶²：咖灰蝶 (<i>Catochrysops strabo</i>) 及無斑珂弄蝶 (<i>Caltonis bromus</i>)。 ■ 蜻蜓³：海南環尾春蜓 (<i>Lamelligomphus hainanensis</i>)及亞力施春蜓 (<i>Sieboldius alexanderi</i>)。 		
		總分：	2.70

¹ 稀有鳥類包括(i)世界自然保育聯盟紅皮書中列為「極危」、「瀕危」或「漸危」，或(ii)中國瀕危動物紅皮書中列為「瀕危」、「易危」或「稀有」的品種。以「*」號標記的鳥類乃本地常見品種。

² 稀有度按楊建業、饒戈(2002)所著《香江蝶影》釐定。

³ 稀有度按韋敬輝(2003)所著《香港蜻蜓圖鑑》釐定。