

如被咬後應怎樣做？

市民應避免接觸紅火蟻。若被紅火蟻螫傷，請採取以下措施：

- 以肥皂和清水輕度洗滌患處；
 - 保持水疱完整，不要抓搔或弄穿水疱；
 - 冷敷患處以減輕腫脹及疼痛；
 - 如有需要，請徵詢醫生的意見。
- * 如患者曾有昆蟲過敏反應的記錄，或懷疑有過敏的反應，應立即求醫。這些過敏反應包括：急速發紅或出現風疹塊；面部、眼部或喉嚨腫脹；胸口疼痛；作嘔；大量出汗；呼吸困難；或暈眩等。

查詢

- 1823電話中心 : 1823
- 香港政府一站通網址 : www.gov.hk
- 衛生防護中心網址 : www.chp.gov.hk
- 漁農自然護理署網址 : www.afcd.gov.hk

應付紅火蟻問題

甚麼是紅火蟻？

- 紅火蟻是蟻的其中一個物種，正式名稱為「入侵紅火蟻」(*Solenopsis invicta* Buren)。

如何分辨紅火蟻及其他蟻？

- 紅火蟻的體型細小(約3—6毫米)，很難憑形態特徵和其他本地螞蟻分辨。但是，紅火蟻一旦受到騷擾，會立即空群而出，作出攻擊。

紅火蟻是否本地品種？原產自那處？

- 紅火蟻是原產南美一帶的小型螞蟻，牠隨著商業活動和農產品運輸而擴散，1920年代傳入美國南部，2001年入侵澳洲地區，2003年証實在台灣出現，2004年底更在廣東出現。

紅火蟻對我們有甚麼影響？

- 由於紅火蟻的族群龐大和攻擊性強，會對生態環境構成影響。
- 紅火蟻亦會以螫針螫刺人類。在健康方面，紅火蟻的螫刺可引致疼痛、灼痛、發癢及皮膚上出現水疱；只要適當護理，傷口會在10至14天痊癒。在罕見的情況下，螫刺會造成嚴重過敏反應，可導致死亡。根據現時資料顯示，被紅火蟻螫刺後會出現嚴重過敏反應的個案只佔非常少數。



紅火蟻蟻丘

紅火蟻在那裏築巢及活動？

- 紅火蟻一般於雜草叢生的荒地、農田田埂、堤壩、路邊、村道、草坪、花槽、花園、高爾夫球場等地方築巢。



蟻丘四周環境



紅火蟻的巢穴有何特點？

- 最容易的分辨方法是辨認蟻丘。紅火蟻會在蟻巢入口築起 10 - 45 厘米高的土丘。

如何消滅紅火蟻？

- 如發現疑似紅火蟻，數量少的可以一般家用殺蟲劑殺滅。如發現大量疑似紅火蟻，應聘請專業滅蟲公司作殺蟲處理。施放殺蟲劑時，請參照殺蟲劑的標籤施藥及配戴合適的保護衣物。此外，應重複檢查曾發現紅火蟻蟻丘的地點，以確保徹底消滅紅火蟻。



紅火蟻成蟲