



## 綜合防治方法

1. 選用抗病品種
2. 增加田間通透性，降低濕度
3. 清理病葉病株、田間積水
4. 翻田曬土
5. 避免偏施氮肥
6. 及時清除雜草上的蟲卵和低齡幼蟲
7. 人手捕捉幼蟲(適用於甜菜夜蛾)
8. 利用誘蟲燈誘殺甜菜夜蛾
9. 保護天敵，如寄生蜂、叉角厲蟾
10. 設置驅鳥球、反光紙、防雀網、超聲波驅鳥器(適用於鳥患)
11. 利用糖醋液誘殺甜菜夜蛾成蟲
12. 與非寄主作物間作套種或輪作
13. 安全地使用不同種類的除害劑  
(可參考下表)



| 防治對象          | 除害劑註冊編號     | 商品名稱         | 除害劑種類 |
|---------------|-------------|--------------|-------|
| 甜菜夜蛾<br>(貪夜蟲) | /           | 魚藤           | 植物性   |
|               | 2P291/2P261 | 清源保(苦參碱)/印楝素 | 植物性   |
|               | 2P012       | 見大利(蘇雲金桿菌)   | 微生物性  |
|               | 2P125/149   | 馬拉硫磷/蟲敵      | 化學性   |
| 菌核病           | 2P047/2P192 | 百菌清/克菌寧      | 化學性   |
| 褐斑病           | 2P183/2P127 | 甲基托布津/鋅錳乃浦   | 化學性   |

如欲查詢更多關於良好農業規範資料，可聯絡  
漁農自然護理署作物科優良農業操作組。  
電話: (852) 2668 0197

## 良好農業規範-生產操作指引

### 菊科

### 生菜、茼蒿



## 一. 生產作業風險管理

### 水

引發危害的原因：

1. 灌溉水受污染

因應對策：

1. 水井應設於適當的地方及定期保養
2. 採用滴灌或噴灌等微量灌溉方法



### 土壤

引發危害的原因：

1. 土壤管理不良

因應對策：

1. 使用重金屬及病原體的含量符合安全標準的泥土
2. 定期檢查土壤質量
3. 適當地施肥

### 農用機械及用具

引發危害的原因：

1. 農具及機械不衛生
2. 用者使用不當

因應對策：

1. 定期清潔、保養及維修
2. 提供足夠訓練給農場工人

### 種子

引發危害的原因：

1. 種子品質欠佳
2. 存放不當

因應對策：

1. 選不易受病蟲害感染或不含基因改造的品種
2. 檢查種子有否損壞、畸形、受病菌感染或混有雜質
3. 儲存於清潔、清涼及乾爽的地方

### 肥料

引發危害的原因：

1. 不當使用肥料
2. 堆肥未經適當處理/未完全發酵

因應對策：

1. 從信譽良好的供應商購買
2. 使用已腐熟(乾身沒有臭味)的堆肥
3. 肥料應存放於遠離除害劑的地方

### 病蟲草害防治

引發危害的原因：

1. 不當施用除害劑
2. 田間衛生欠佳

因應對策：

1. 按標籤所示調配、施用及棄置
2. 輪換用藥
3. 制訂病蟲害綜合管理計劃

## 二. 土壤管理

1. 結構：

含豐富有機質、排水良好的砂質壤土

2. 酸鹼度：

pH 6 – 7

3. 養份：

基肥

I) 完全腐熟堆肥

II) 磷質含量較高的骨粉

追肥

I) 在生長期間，視乎植株的生長表現，薄施含氮較高的有機肥料或複合肥料 2-3 次

4. 進行中耕培土



## 三. 病蟲害管理

### 常見蟲害

1. 甜菜夜蛾(貪夜蟲)



### 動物危害

1. 鳥患



### 常見病害

1. 菌核病



2. 褐斑病

