

## 栽培撮要

|               | 結球白菜   | 西蘭花苗  |
|---------------|--|---|
| <b>栽培環境</b>   | 生長適溫為10至25℃。本地9月至11月間均適宜播種和種植。以酸鹼值6.5至7.5，含豐富有機質，排水和透氣良好的土壤為宜。   | 生長適溫為15至25℃。本地10月至翌年2月間均適宜播種和種植。以土層深厚，酸鹼值6.0至7.5，含豐富有機質，排水和透氣良好的土壤為宜。   |
| <b>種植和株行距</b> | 播種後約20天，待幼苗長出2至3片真葉時便可移植。<br><br>株行距約30公分(12吋)。  | 播種後約21至28天，待幼苗長出4至6片真葉時便可移植。<br><br>株行距約45公分(18吋)，以品字形排列。   |
| <b>施肥和管理</b>  | 基肥：每斗種地施堆肥約1000公斤或麩粉和骨粉各90公斤。<br><br>追肥：移植後2星期，每株施有機肥(氮：磷：鉀 = 4：3：3)20克。2星期後再追肥。<br><br>其後可視乎生勢施葉面肥一次。 | 基肥：每斗種地施堆肥1000公斤，麩粉和骨粉各50公斤。<br><br>追肥：移植後2星期，每株施有機肥(氮：磷：鉀 = 4：3：3)20克。2至3星期後再以同等份量追肥。其後可視乎生勢進行第三次追肥。<br><br>每次追肥時清除雜草，並進行中耕培土，以防止植株倒伏。 |
| <b>採收</b>     | 視乎氣候，移植後約80至90天便可採收。   | 視乎氣候，移植後約55至70天開始初收，採收期長。側花枝會不斷長出，適時採收長柄小花球，否則花蕾綻放，影響外觀。  |

(1斗種 = 674平方米 或 7 260平方呎)

漁農自然護理署園藝組  
2021年10月