

超甜白粟米栽培撮要

栽培環境	性喜溫暖濕潤的氣候，本地全年均可栽培。以土層深厚、含豐富有機質、排水良好、酸鹼度在6.0~7.0的砂質壤土最適合。不同品種的甜粟應在不同時間種植，或相隔300~500公尺以上才栽種，以免引起雜交，影響品質。
種植及株行距	育苗移植或直播皆可。種子發芽約需四天，幼苗長出兩對真葉時(播種後約8~10天)便可移植。直播每穴播種子兩粒，萌芽後間拔弱苗，留健苗一株。 行距約40~50公分，株距約25~30公分。
施肥及管理	基肥：每斗地施堆肥1 000公斤、麩粉50公斤及骨粉50公斤。 追肥：幼苗定植後一星期進行第一次追肥。每斗地施麩粉及骨粉各25公斤及有機肥料40公斤(N:P:K=4:3:3)。 在雄穗抽出前(定植後約四星期)進行第二次追肥。每斗地施麩粉及骨粉各25公斤及有機肥料120公斤(N:P:K=4:2:10)。 去除第二穗後(定植後約七星期)進行第三次追肥。施肥量與第二次追肥相同。
植株調整	生長期間，保持泥土有適當水分，並施行中耕除草和培土兩至三次。生長初期除去側芽，以促進植株生長粗壯。如第二穗生長強健，可加以保留，待成熟後採收。
採收	當果穗頂端的花絲呈棕褐色、開始轉乾和卷縮、果穗籽粒飽滿時(約播種後70~80天)便可採收。宜在早上進行採收，並隨即運往市場銷售。

漁農自然護理署園藝組
2019年5月