

栽培撮要

	苦瓜和節瓜
栽培環境：	生長適溫為25℃-30℃。喜溫暖及陽光充足的環境。以土層深厚，排水良好，含豐富腐殖質，酸鹼度6.0~6.8的壤土為佳。
種植及株行距：	以種子育苗移植栽培為佳。幼苗長出3~5片真葉時，便可移植到田間。 株行距約為60公分x120公分，單行種植。
施肥及管理：	基肥：每斗地約施堆肥1,000公斤或麩粉及骨粉各90公斤。 追肥：定植後兩星期，每株追施有機肥(N:P:K=4:3:3)50克。當植株的雌花開花時，份量加倍至100克，然後每隔2星期一次直至植株生長停頓為止。 (1斗地等於7,260平方呎)
植株調整：	植株長至40公分高時要用竹架支撐莖蔓生長。主蔓低節位的側蔓和瓜全部摘除，以促進植株生長。生長期間，保持泥土有適當水分，進行中耕培土及除草，剪去過密枝葉。小果要垂直生長。 當雌花凋謝及形成雛果（約指頭大）時，便要立即進行套袋，以防禦瓜蠅的侵害，增加市場價值。
採收：	苦瓜 - 由播種至初收約 75天，採收期70天 節瓜 - 由播種至初收約 60天，採收期60天