

有機結球白菜栽種技術



結球白菜

分類：十字花科 *Cruciferae*

芸薹屬 *Brassica*

白菜種中的一個亞種



學名：*Brassica campestris* L. ssp. *pekinensis*



漁護署與香港種子商會合作挑選的優良品種

推介品種 (一) : **45天勇士**

種源 : 日本



推介品種 (二) : **日本娃娃菜**

種源 : 日本



品種特色

45天勇士白菜



- 抗病
- 耐熱
- 早熟



- 葉球呈小球狀
- 重約1公斤
- 葉色翠綠，葉片無毛



品種特色

日本娃娃菜

- 抗病
- 耐熱
- 早熟



- 葉球呈橢圓形
- 重約 0.5 公斤
- 葉色翠綠，葉背有毛



栽培環境

宜於本地 10 月至 3 月播種栽培



土層深厚

排水及通氣良好

土壤酸鹼度

6.5 ~ 7.0

• 幼苗長出 2~3 片真葉時便可進行定植

育苗

定植

• 定植時株距為 30 公分

採收

(月份)

10

11

12

1

• 注意蟲害

• 追肥 2 次

結球白菜栽培撮要

育苗

- 以穴盤育苗
- 播種後約 20 天，幼苗長出 2~3 片真葉時，便可定植。

整地施基肥

- 每斗耕地施放充足基肥
堆肥 1,000 公斤
或
麩粉 90 公斤 及 骨粉 90 公斤


定植

- 株行距約 30 公分 (12 吋)



追肥

- 定植後 2 星期，施第一次追肥；
- 再兩星期後，施第二次追肥；
- 以後視乎生勢，需要時施以葉面肥一次。



使用有機肥料
(N:P:K = 4:3:3)

主要蟲害：



像行軍蟲



吊絲蟲



作物受狗蟲仔為害



狗蟲仔

蟲害防治

物理防治狗蝨仔：

- 圍防蟲網



- 使用吸蟲機



有機農藥：

- 蘇雲金桿菌
- 多角體病毒

採收



視乎氣候，
定植後約
45 ~ 65天
便可採收。



謝謝