

如被咬後應怎樣做？

市民應避免接觸任何紅火蟻，若被紅火蟻螫傷，應採取以下措施：

- 冷敷皮膚以減輕腫脹及疼痛；
- 以肥皂和水洗滌患處及不要弄穿水疱；
- 不要抓搔水疱；
- 如有需要，聽取醫生的意見；及
- 如患者有昆蟲過敏反應或曾快速發紅、出現風疹塊；面部、眼或喉嚨腫脹；胸口疼痛；噁心；大量出汗；呼吸困難；及暈眩等，應立即求醫。

查詢

- 漁農自然護理署植物及除害劑監理科，九龍長沙灣道303號長沙灣政府合署五樓。
電話：2150 7000
電郵：plantlic@afcd.gov.hk
- 衛生署24小時健康教育熱線：2833 0111
- 政府網址：www.gov.hk

應付紅火蟻問題

甚麼是紅火蟻？

- 紅火蟻是蟻的其中一個品種，正式名稱為「入侵紅火蟻」(*Solenopsis invicta* Buren)。

如何分辨紅火蟻及其他蟻？

- 紅火蟻的體型細小(約3－6毫米)，很難憑形態特徵和其他本地螞蟻分辨。但是，紅火蟻一旦受到騷擾，會立即空群而出，作出攻擊。

紅火蟻是否本地品種 / 原產自那處？

- 紅火蟻是原產南美一帶的小型螞蟻，牠隨著商業活動和農產品運輸而擴散，1920年代傳入美國南部，2001年入侵澳洲地區，2003年証實在台灣出現，2004年底更在廣東出現。

紅火蟻對我們有甚麼影響？

- 由於紅火蟻的族群龐大和攻擊性強，會對生態環境構成影響。
- 紅火蟻亦會以螫針螫刺人類。在健康方面，紅火蟻的螫刺可引致疼痛、灼痛、發癢及皮膚上出現水疱；只要適當護理，傷口會在10至14天痊癒。在罕見的情況下，螫刺會造成嚴重過敏反應，可導致死亡。根據現時資料顯示，被紅火蟻螫刺後會出現嚴重過敏反應的個案只佔非常少數。



紅火蟻蟻丘

紅火蟻在那裏築巢及活動？

- 紅火蟻一般於雜草叢生的荒地、農田田埂、堤壩、路邊、村道、草坪、花園、高爾夫球場等較為陰暗的地方築巢。



紅火蟻的巢穴有何特點？

- 最容易的分辨方法是辨認蟻丘。紅火蟻會在蟻巢入口築起 10 – 45 厘米高的土丘。

如何消滅紅火蟻？

- 如發現可疑螞蟻，數量少的可以一般家用殺蟲劑殺滅。如發現大量可疑螞蟻，應聘請專業滅蟲公司作殺蟲處理。施放殺蟲劑時，請參照殺蟲劑的標籤施藥及配戴合適的保護衣物。

樣本採集與遞送

- 請將已死的可疑螞蟻用 70% 酒精浸泡，標明採集時間、採集地點、採集人員和聯絡資料，並將樣本送至[九龍長沙灣道 303 號長沙灣政府合署五樓漁農自然護理署植物及除害劑監理科](#)。請確保遞送過程中樣本的安全，而採集樣本時亦請注意安全，避免被該蟻叮咬。

蟻丘四周環境



紅火蟻成蟲