




漁農自然護理署
Agriculture, Fisheries and
Conservation Department

非洲豬瘟

非洲豬瘟不會傳染人類，
豬隻受到感染後的死亡率可**高達100%**。
但現時並無疫苗和藥物可作預防或治療非洲豬瘟。

非洲豬瘟病毒的存活性極強，可以在血液，
排泄物和受感染的病豬組織中持續存在數月。
而未經徹底煮熟的受感染豬肉製品、以及在低溫的條件下，
病毒甚至可存活達6個月以上甚至數年。

傳播 方式



**接觸受非洲豬瘟
感染的豬隻**



**使用受感染豬隻
製成的肉製品及廚餘**



**接觸受病毒污染的物品
如鞋子，衣服，車輛，設備等的污染物**

如何殺死 非洲豬瘟病毒

依據世界動物衛生組織 (OIE) 專家建議

以下消毒劑可有效滅活非洲豬瘟病毒



**接觸時間
最少30分鐘**

**8/1 000
氫氧化鈉
Sodium
hydroxide**

**0.03% -
0.5%
次氯酸鹽
Hypochlorites**

**3/1 000
福爾馬林
Formalin**

**3%
鄰苯基苯酚
Ortho-
phenylphenol**

**碘化合物
Iodine
compounds**